

Moncalieri, 14/04/2020

Comunicato del Medico Competente

Oggetto: Misure di contenimento del rischio di contagio sul luogo di lavoro da Covid 19 negli interventi di primo soccorso

Spett. le Dirigente Scolastico, RSPP / RLS / addetti P.S.

Nel contesto dei protocolli e delle misure preventive definite per impedire (o limitare) la diffusione dell'infezione da covid 19 sul luogo di lavoro, deve essere preso in considerazione il rischio legato ad eventuali **interventi di primo soccorso da parte degli addetti preposti**. Infatti per la natura stessa dell'azione nella fase di soccorso dell'addetto P.S., non è sempre possibile garantire il mantenimento di una distanza superiore al metro. Per tale ragione e limitatamente alla durata del periodo di emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese e fino alla ripresa della frequenza scolastica da parte dei ragazzi, suggerisco di adottare delle specifiche procedure straordinarie di cui informare gli addetti P.S.

In caso di emergenza sanitaria a causa di infortunio o malore (non covid19), tutta la squadra dovrà attivarsi e seguire le note procedure per allertare i soccorsi esterni, rendere disponibile il materiale di primo soccorso (cassetta ed eventuale DAE) e mettere in sicurezza l'area interessata. Se la situazione richiederà un intervento diretto con contatto fisico con l'infortunato, **solo uno o il numero minimo di addetti si avvicinerà** e attuerà gli interventi di soccorso ritenuti necessari. L'addetto/ gli addetti in questione dovrà/dovranno:

- 1) indossare protezioni particolari quali mascherina almeno FFP2, guanti impermeabili, maschera facciale o occhiali a protezione biologica, camice

impermeabile /plastico (tali dispositivi sono di facile reperibilità e basso costo)

- 2) se è cosciente e qualora possibile, far indossare una mascherina chirurgica all'fortunato
- 3) in caso di necessità di attivare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, è consigliato limitarsi alle manovre di compressione toracica evitando la respirazione bocca a bocca
- 4) In caso di infortunio lieve, quando possibile, sarà preferibile che l'addetto al primo soccorso guidi l'fortunato ad auto-medicarsi
- 5) tutto il materiale eventualmente contaminato con liquidi biologici (garze, bende, ecc..) e i dispositivi di protezione utilizzati, andranno accuratamente raccolti, inseriti in sacchetto plastico chiuso e smaltiti nell'indifferenziato. L'area dell'intervento dovrà essere disinfettata con ipoclorito di sodio allo 0,15- 0,20%

Cordiali saluti

Il Medico Competente

Dr. Giulio Angelo Boario

